

В зависимости от степени расстройства функций организма и ограничений жизнедеятельности при некоторых заболеваниях почек дети признаются инвалидами.

Признание лица инвалидом осуществляется федеральным учреждением медико-социальной экспертизы. Правила признания лица инвалидом устанавливаются Постановлением Правительства РФ от 20.02.2006 № 95 «О порядке и условиях признания лица инвалидом».



Если Ваш ребенок страдает патологией почек

Памятка для родителей

Комитет здравоохранения Курской области

2016 г.

Почки – молчаливый орган, они очень редко болят. Некоторые заболевания почек протекают в скрытой форме, без стандартных симптомов. Именно поэтому родители должны обращать внимание на абсолютно любые изменения в самочувствии ребёнка.

Факторы развития нефрологических заболеваний:

- Наследственность
- Осложнения внутриутробного развития и родовые травмы
- Различные инфекции
- Переохлаждение
- Плохой уход за половыми органами малыша.

Полезные советы родителям

Ребенку нужно правильно питаться: пересоленная, жирная, острая пища вредна для организма.

Ребёнку необходимо выпивать достаточное количество воды в день, при этом из рациона следует исключить газированную воду.

Следите, чтобы ребёнок регулярно посещал туалет: застой мочи очень плохо влияет на работу почек.

Не допускайте перегрева и переохлаждения ребёнка.

Что должно вызвать беспокойство родителей?

- У ребёнка в течение дня отекают ноги или лицо
- Ребёнок слишком мало или слишком много мочится
- Изменение цвета мочи
- Моча становится мутной
- Появление в моче слизи или кровяных разводов
- Постоянное покраснение наружных половых органов
- Необычный или даже гнилостный запах мочи
- Мочеиспускание вызывает боль, ребенок начинает плакать
- Немотивированное повышение температуры тела
- Подъем артериального давления
- Острая боль в животе или пояснице
- Бледная кожа
- Ночной и дневной энурез у детей старше 4-х лет
- Ребенок прилагает усилия, чтобы помочиться.

Все перечисленные симптомы – признаки серьезной болезни почек и других органов мочевой системы. Если Вы заметили у своего ребёнка хотя бы один, то Вам необходимо срочно обратиться к врачу.